

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ




Служба
здоровья

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ИППП

- Сохраняйте целомудрие. Человек созревает до половой жизни только к 18-19 годам.
- Не забывайте о вакцинации против гепатита В и вируса папилломы человека.
- Откажитесь от случайных половых связей.
- Соблюдайте правила личной гигиены и требуйте это от своего партнёра.
- Используйте презервативы.



Служба
здоровья



ОСЛОЖНЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ИППП

- воспалительные заболевания органов малого таза
- онкологические заболевания (рак шейки матки)
- отклонения в состоянии здоровья новорождённых
- бесплодие



Служба
здоровья



ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ ИППП

- нехарактерные выделения
 - нарушение мочеиспускания
 - высыпания на коже
 - зуд и жжение
 - боль
- 



**Служба
здоровья**

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ (ИППП) -

это инфекции, передающиеся от человека к человеку через сексуальный контакт, через инфицированную кровь. Некоторые инфекции могут передаваться от матери к ребенку во время беременности или родов.

ИППП могут вызываться более чем 30 возбудителями. Наиболее частые: сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, ВИЧ, гепатит В, герпес и вирус папилломы человека.



Служба
здоровья



ИППП опасны для здоровья будущих детей

Вмешиваясь в процесс формирования и развития плода, возбудители ИППП вызывают различные **врожденные уродства, иногда несовместимые с жизнью.**

В некоторых случаях аномалии развития проявляются через несколько лет после рождения ребенка в виде **дисфункции сердца, печени, почек и умственных способностей.**



ИППП – это инфекции, передаваемые половым путем. Наиболее часто встречающиеся: сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, аногенитальные бородавки, генитальный герпес.

Важная информация об ИППП

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ:

-Преимущественные:

все виды незащищенных сексуальных контактов (вагинальные, оральные, анальные),

-Возможные:

через инфицированную кровь (от матери к ребенку), при несоблюдении правил личной гигиены.

Симптомы ИППП:

Боль или жжение при мочеиспускании, выделения из половых органов, высыпания на коже и слизистых оболочках, НО часто ИППП протекают и бессимптомно.

Самоизлечения при ИППП не бывает, необходимо как можно раньше обратиться к дерматовенерологу, чтобы не возникло осложнений.

При подозрении на ИППП:

- ✓ не отчаиваться,
- ✓ не заниматься самолечением, в том числе по рекомендациям друзей и интернет-ресурсов, а немедленно обратиться к врачу-специалисту.

Как узнать есть ли у Вас ИППП?

Больны ли Вы может определить только врач, проведя необходимое обследование.

Если у полового партнера установлен диагноз ИППП, а у вас нет симптомов заболевания, Вам необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу.



Обследование на ИППП является конфиденциальным (результаты не разглашаются) и включает целый ряд исследований.

Как защититься от ИППП?

1. Строить сексуальные отношения только с одним партнёром, который здоров и верен Вам!
2. Правильно использовать презерватив при каждом половом акте. Это значительно снижает риск инфицирования.
3. Отказаться от рискованного поведения: не употреблять наркотиков и не злоупотреблять алкоголем, так как их действия снижают самоконтроль.