



Вакцина для профилактики гриппа

СОВИГРИПП

Вакцина гриппозная инактивированная субъединичная

СОВИГРИПП ФОРМИРУЕТ ВЫСОКИЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД. ВОЗМОЖНА ВАКЦИНАЦИЯ В НАЧАЛЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ.

Показания к применению:

Активная ежегодная профилактическая иммунизация против сезонного гриппа детей с 6 месяцев, подростков (до 18 лет применяется вакцина без консерванта), взрослых без ограничения возраста и беременных женщин во II-III триместрах беременности (применяется вакцина без консерванта).



Противопоказания:

- Аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины.
- Сильная поствакцинальная реакция (температура выше 40 градусов, отёк и гиперемия в месте введения выше 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс, судороги, анафилаксия) на предыдущее введение препарата.
- Острые инфекционные/неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
- При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры.



Для вакцинации против гриппа обратитесь в поликлинику по месту прикрепления.

НА ТЕРРИТОРИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВИГРИПП ПОСТУПИЛ ДЛЯ ИММУНИЗАЦИИ **ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**

Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом (фельдшером) с проведением термометрии.



Способ введения:

Детям старше 3 лет, подросткам и взрослым вакцину вводят однократно внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (в область дельтавидной мышцы) в дозе 0,5 мл.

Детям от 6 мес. до 3 лет вакцину вводят в дозе 0,25 мл. двукратно с интервалом 4 недели в передненаружную поверхность бедра внутримышечно.



ГБУЗ НО НОЦОЗМП
ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Вакцина для профилактики гриппа

Ультрикс Квадри

Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная

УЛЬТРИКС КВАДРИ ФОРМИРУЕТ ВЫСОКИЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ ГРИППА ТИПА А И В. ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ АНТИТЕЛА ПОЯВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ 8-12 ДНЕЙ, ИММУНИТЕТ СОХРАНЯЕТСЯ ДО 12 МЕСЯЦЕВ.

Показания к применению:

Активная ежегодная профилактическая иммунизация против сезонного гриппа детей с 6-ти месячного возраста, подростков и взрослых до 60 лет, беременных женщин во II-III триместрах беременности.

Противопоказания:

- Аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами, куриный белок и другие компоненты вакцины.
- Сильная поствакцинальная реакция (температура свыше 40 градусов, отёк и гиперемия в месте введения свыше 8 см в диаметре) или осложнение на предыдущее введение гриппозных вакцин в анамнезе.
- Острые инфекционные/неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
- При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры.
- Детский возраст до 6 месяцев.



Способ введения:

- Детям старше 36 месяцев, подросткам и взрослым вакцину вводят однократно в область дельтавидной мышцы (верхняя треть наружной поверхности плеча) в прививочной дозе 0,5 мл.
- Детям в возрасте 12-35 месяцев вакцину вводят двукратно с интервалом в 28 дней в переднебоковую поверхность бедра или область дельтавидной мышцы в прививочной дозе 0,25 мл.
- Детям в возрасте от 6 до 11 месяцев вакцину вводят двукратно с интервалом 28 дней в переднебоковую поверхность бедра в прививочной дозе 0,25 мл.

НА ТЕРРИТОРИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ УЛЬТРИКС КВАДРИ ПОСТУПИЛ ДЛЯ ИММУНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом (фельдшером) с проведением термометрии.



Для вакцинации против гриппа обратитесь в поликлинику по месту прикрепления.



Вакцина для профилактики гриппа

Ф Л Ю - М

Вакцина гриппозная инактивированная расщепленная


ФЛЮ-М ФОРМИРУЕТ РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА К АКТУАЛЬНЫМ ШТАММАМ ГРИППА ТИПОВ А И В. ИММУНИТЕТ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 8-12 ДНЕЙ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ И СОХРАНЯЕТСЯ ДО 12 МЕСЯЦЕВ.

Показания к применению:

Активная ежегодная профилактическая иммунизация против сезонного гриппа детей с 6 лет, подростков и взрослых (включая лиц старше 60 лет). Для вакцинации детей от 6 до 18 лет применяется вакцина без консерванта.

Противопоказания:

- Возраст до 6 лет, возраст до 18 лет (при применении вакцины, содержащей консервант).
- Аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины, на ранее вводимые гриппозные вакцины.
- Сильная реакция (температура выше 40 градусов, отёк и гиперемия в месте введения выше 8 см в диаметре) или осложнение на предыдущее введение препарата.
- Острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
- При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры.



НА ТЕРРИТОРИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ФЛЮ-М ПОСТУПИЛ ДЛЯ ИММУНИЗАЦИИ **ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**



Для вакцинации против гриппа обратитесь в поликлинику по месту прикрепления.

Способ введения:

Вакцина вводится однократно в дозе 0,5 мл внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (в область дельтовидной мышцы).



Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом (фельдшером) с проведением термометрии.